

ترکیب شده واز طریق کمک به هضم

چربیها نقش مهمی را در عمل گوارش ایفا

میکند.

* التهاب حاد کیسه صفرا باعث

درد، حساسیت، سفتی قسمت فوقانی و راست

شکم میشود که ممکنست به ناحیه وسط جناغ یا

شانه راست منشعب شود و با تهوع و استفراغ و

نشانه های معمول التهاب حاد همراه است که این

حالت اصطلاحاً **کله سیستیت حاد** گفته میشود.

* پس از گذشت ۴ تا ۶ هفته عملکرد مجاری

صفراوی به حالت اول بر میگردد و بعد از این


* صفرا مایعی است که در کبد ساخته شده

و سپس در کیسه صفرا ذخیره میشود پس از

صرف غذا کیسه صفرا منقبض میشود و

صفرا را با فشار به درون دوازدهه (قسمت

اول روده کوچک) تخلیه میکند.



* صفرا حاوی آب، کلسیترول

، چربیها، نمکهای صفراوی، پروتئینها و

بیلیروبین است. نمکهای صفراوی با چربی



« بسمه تعالی »

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان

مرکز آموزشی - درمانی پورسینا

آموزش به بیمار در کله سیستکتومی

(عمل کیسه صفرا و مراقبتهای بعد عمل)

(آنچه همراهان باید بدانند)



تهیه و تنظیم: سمیه صفرزاده

زیر نظر سوپروایزر آموزشی

زمستان ۹۲

فعالیت سبک را شروع نموده و ورزشهای توصیه

شده مثل قدم زدن و راه رفتن را انجام دهید.

* جهت کاهش درد از داروهای مسکن طبق

دستور پزشک استفاده کنید در صورتیکه درد

شما با استفاده از ضد دردها تسکین نمی یابد به

جراح اطلاع دهید.

* ممکنست روزی یک تا سه بار مدفوع شل

دفع کنید که علت آن ورود مستقیم مداوم

صفرها به ابتدای روده کوچک پس از عمل کیسه

صفرها است. معمولا دفعات اجابت مزاج پس از

چند هفته تا چند ماه کم میشود.

* در صورت مشاهده هر گونه تغییر رنگ

مدفوع به پزشک اطلاع دهید زیرا ممکنست

نشاندهنده بروز عوارض باشد.

* در صورت بروز علائمی چون زردی در پوست

و چشمها، ادرار تیره رنگ، مدفوع رنگ

پریده، خارش یا علائم التهاب و عفونت مثل تب و

درد حتما به پزشک خود مراجعه کنید.

* از زخم ناحیه عمل خود مراقبت لازم را بعمل

آورید. محل عمل پانسمان تمیز داشته باشد و در

صورت مشاهده هر گونه ترشح چرکی و

قرمزی در زخم یا اطراف ناحیه عمل سریعا به

پزشک مراجعه کنید.

* به جراح خود بعد از ترخیص حتما مراجعه

کنید.

